

KENN-U.DIFF. ARTEN MESOBROMETUM

PRIMULETOSUM U.ARRH. ETUM-BRACHE

Diff.2b,3 (S = Saumart)

Coronilla varia (S)

Daucus carota

Primula veris

Chrysanthemum corymbosum (S)

Prunella grandiflora

Diff.2b2

Campanula glomerata

Trisetum flavescens

Fragaria vesca

Phleum phleoides

Molinio-Arrh.ea Arten,Diff.2b2,3

Arrhenatherum elatius

Lathyrus pratensis

Galium album

Holcus lanatus

Ubrige Diff.2b2,3

Poa angustifolia

Stachys officinalis

Allium oleraceum

Campanula rotundifolia

Vicia angustifolia

Molinio-Arrh.ea Arten,Diff.3

Anthriscus sylvestris

Heracleum sphondylium

Rumex acetosa

Anthoxanthum odoratum

Plantago media

Festuca pratensis

Ubrige Diff.3

Ranunculus nemorosus

Pastinaca sativa

Galeopsis tetrahit

Poa trivialis

EINDRINGENDE SAUMARTEN (MÄSSIG) FRI-

SCHER (NITRATREICHER) STANDORTE

Veronica chamaedrys

Campanula persicifolia

Solidago virgaurea

Vicia sepium

Agrimonia eupatoria

Hieracium umbellatum

Campanula rapunculoides

Stellaria graminea

Trifolium medium

Campanula rapunculus

Urtica dioica

Galium aparine

Torilis japonica

Potentilla sterilis

SONSTIGE ARTEN

Fest.-Br.ea-Arten ohne diagn.Wert

Bromus erectus

Centaurea scabiosa

Salvia pratensis

Brachypodium pinnatum

Pimpinella saxifraga

Mol.-Arrh.ea-Arten ohne diagn.Wert

Lotus corniculatus

Knautia arvensis

Dactylis glomerata

Plantago lanceolata

Achillea millefolium

Centaurea jacea

Trifolium pratense

Taraxacum officinale

Chrysanthemum leucanthemum

Leontodon hispidus

Rhinanthus alectorolophus

Tragopogon pratensis

Ranunculus acris

BEGLEITER (GEHÖLZE)

Quercus petraea (K,Str)

Corylus avellana (K,Str)

Prunus spinosa

Ligustrum vulgare

Hedera helix

Prunus avium

Rubus fruticosus agg.

Sorbus torminalis

Rosa spec.

Pinus sylvestris

Carpinus betulus

Acer campestre

BEGLEITER (KRAUTIGE PFLANZEN)

Festuca ovina

Hypericum perforatum

Genista tinctoria

Picris hieracoides

Orobancha spec.

Tragopogon dubius

Carex muricata agg.

Cladonia spec.

Acrokarpe Kleinmoose

Avena pubescens

Briza media

Senecio erucifolius

Melilotus alba

Colchicum autumnale

Convolvulus arvensis

Erläuterungen zu den Stetigkeits-Spalten (Vergleich der hier gewonnenen Tabelle mit v.ROCHOW 1948;

die Tabelle v.ROCHOWs bezieht sich auf den gesamten Kaiserstuhl, enthält jedoch Aufnahmen aus Schelingen)

1. Arten, die in den Aufnahmen v.ROCHOWs völlig fehlen, mit Stetigkeit I und mehr:

Potentilla tabernaemontani IV⁺², Inula conyzia III⁺¹, Allium sphaerocephalum II⁺¹,

Peucedanum cervaria II⁺², Prunus spinosa II⁺², Chrysanthemum corymbosum II⁺¹, Fragaria vesca I⁺¹,

Lathyrus pratensis I⁺¹, Veronica chamaedrys I⁺¹, Ligustrum vulgare I⁺¹, Tragopogon dubius I⁺.

2. Arten, die nur in den Aufnahmen v.ROCHOWs auftreten, mit Stetigkeit I und mehr:

Asperula cynanchica IV¹⁻², Camptothecium lutescens III⁺³, Carex flacca II⁺², Polygala amara II⁺,

Sedum sexangulare II⁺², Galium pumilum II⁺, Rhinanthus serotinus II⁺, Thymus froelichianus II⁺,

Medicago falcata II⁺¹, Teucrium montanum I⁺¹, Scabiosa canescens I⁺², Festuca rubra I⁺²,

Gymnadenia conopsea I⁺¹, Populus tremula I⁺, Euphorbia seguierana I⁺², Phyteuma orbiculare I⁺¹.

Stetigkeitsklassen:

r bis 5 %

I 6 - 10 %

II 11 - 20 %

III 21 - 40 %

IV 41 - 60 %

V 61 - 80 %

VI 81 - 100 %

(Art in ... % der

Aufnahmen vorhanden)