

Tabelle 1. Pflanzensoziologische Tabelle der Untersuchungsfläche im Naturschutzgebiet „Scheibenbuck“ (Höhe U.M.: 393 m - 410 m; geologischer Untergrund: Essexit mit dünner Lössauflage)

Erläuterungen zu den Stetigkeits-Spalten (Vergleich der hier gewonnenen Tabelle mit v.ROCHOW 1948; die Tabelle v.ROCHOWS bezieht sich auf den gesamten Kaiserstuhl, enthält jedoch Aufnahmen aus Schelin)

1. Arten, die in den Aufnahmen v. ROCHOWS völlig fehlen, mit Stetigkeit 1
+2 +1

Potentilla tabernaemontanae IV⁺⁺-2, Inula conyzoides III⁺⁺-1, Allium sphaerocephalum II⁺⁺-1,
 Peucedanum cervariae II⁺⁺-2, Prunus spinosa II⁺⁺-2, Chrysanthemum corymbosum II⁺⁺-1, Fragaria vesca I,
 Lathyrus pratensis I⁺⁺-1, Veronica chamaedrys I⁺⁺-1, Ligustrum vulgare I⁺⁺-1, Tragopogon dubius I⁺.

2. Arten, die nur in den Aufnahmen v.ROCHOWs auftreten, mit Stetigkeit I und mehr:

Asperula cynanchica II⁺⁺, *Camptothecium lutescens* III⁺⁺, *Carex flacca* II⁺⁺, *Polygala amara* II⁺, *Sedum sexangulare* II⁺⁺, *Galium pumilum* II⁺, *Rhinanthus serotinus* II⁺, *Thymus froelichianus* II⁺, *Medicago falcata* II⁺⁺, *Teucrium montanum* I⁺⁺, *Scabiosa canescens* I⁺⁺, *Festuca rubra* I⁺⁺, *Gymnadenia conopsea* I⁺⁺, *Populus tremula* I⁺, *Euphorbia seguieriana* I⁺⁺, *Phyteuma orbiculare* I⁺⁺.

Stetigkeitsklassen:			
	bis 5 %		
r	6	-	10 %
+	11	-	20 %
I	21	-	40 %
II	41	-	60 %
IV	61	-	80 %
V	81	-	100 %
(Art in ... % der Aufnahmen vorhanden)			