

Liebe Patienten, liebe Eltern

bei Ihnen soll ein Eingriff in Narkose durchgeführt werden. Ich möchte Sie bitten, die folgenden Informationen aufmerksam durchzulesen und zu beachten.

Sie werden eine Narkose erhalten, die von den meisten Patienten als sehr angenehm empfunden wird. Diese Narkose erfolgt mit den besten derzeit zur Verfügung stehenden Medikamenten sowie einer Überwachung, die deutlich über den gesetzlich vorgeschriebenen Richtlinien liegt.

Mit dieser Seite möchten wir Ihnen einige Hinweise und Erklärungen für die ambulante Operation geben. Es ist von großem Vorteil, wenn Sie vor der Voruntersuchung schon einen der o.a. Bögen durchgelesen und ausgefüllt haben.

OP-Termin:

Um die Wartezeit in meiner Praxisklinik gering zu halten bitten wir Sie pünktlich zur vereinbarten Zeit in der Praxisklinik zu erscheinen. Für den OP-Tag benötigen Sie/Ihr Kind keine besonderen Kleidungsstücke, ein entsprechendes Hemd wird gestellt.

Bei Kinderoperationen: Vor der Operation sollte Zuhause eine Temperaturmessung durchgeführt werden. Bei Fieber oder einer sonstigen Änderung des Gesundheitszustandes bitten wir um eine sofortige telefonische Unterrichtung. Bitte kleben Sie ggf. das mitgegebene Pflaster wie besprochen auf.

Vor der Operation muss der Patient nüchtern sein, d.h. nichts mehr zu sich genommen haben, damit es nicht zu einem Übertritt von Mageninhalt in die Lunge kommen kann. Er darf daher mindestens 6 Stunden vor der Operation nicht mehr essen, Milch trinken, Kaugummi kauen oder Bonbons lutschen. Trinken von Tee (keine Milch!) oder Sprudel ist bis zu 3 Stunden vor dem Termin erlaubt.

Es kommt leider immer wieder vor, dass Kinder vor dem OP Termin etwas naschen, in diesem Fall muss der Termin leider verlegt werden.

Im Vorbereitungsraum / OP

Kleinere Kinder erhalten einen beruhigenden Saft. In Anwesenheit der Bezugsperson legen wir dem Kind eine Plastikkanüle in eine Vene. Dies ist unter Zuhilfenahme eines Betäubungspflasters schmerzfrei und wird auch von ganz kleinen Kindern mitgemacht.

Erwachsene erhalten nur bei Aufregung ein Beruhigungsmittel, da diese Mittel oft lange nachwirken und die geistige Fitness nach der Operation etwas einschränken.

Im OP wird der Patient durch eine Infusion sehr rasch einschlafen und ebenso rasch wird er nach dem Eingriff wie nach einem erholsamen Schlaf wieder erwachen.

Bei kleineren Kindern wird die Narkose üblicherweise noch im Beisein der Eltern im Vorbereitungsraum begonnen.

Aufwachraum:

Nach der Operation betreuen wir Sie noch eine Weile (ca. 2 Stunden) im Aufwachraum. Hier sollte sich auch eine Bezugsperson dazugesellen. Gelegentlich sind Kinder für ca. $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ h im Aufwachraum etwas aufgebracht.

Anschließend kann man trinken, einen Film sehen oder einfach noch schlafen. Meist können Patienten auch schon einen Joghurt essen.

Am Operationstag:

- keine aktive Teilnahme am Straßenverkehr!
- keine schwere körperliche Belastung (auch Toben)!
- Geben Sie bei Schmerzen die verordneten Medikamente
- Stellen Sie sicher, dass Sie auf dem Nachhauseweg in Begleitung sind und zuhause versorgt werden.

Wann ist eine Rücksprache mit uns erforderlich? Rufen Sie mich an bei:

- nicht erträglichen Schmerzen
- Fieberanstieg über 38,5° C
- unerwartetem Auftreten von Schwellungen
- Blutungen
- ununterbrochener Übelkeit
- und auch bei allen sonstigen Problemen

Wie erreichen Sie uns:

Telefon: 02302 / 57093



Türkisch

Sevgili hasta, sevgili anne

Eğer bir işlem anestezi altında yapılmalıdır. Ben dikkatlice aşağıdaki bilgileri okumak ve onları takip isterler.

Çok keyifli olarak hastaların çoğu tarafından algılanan bir anestezi alacaksınız. Bu anestezi en iyi mevcut tedaviler yanı sıra bir monitör, bu oldukça üzerinde yasal kurallar yapılır.

Bu sayfada, size bazı bilgiler ve açıklamalar günübirlik cerrahi için vermek istiyorum. Zaten önce bir ön soruşturma varsa bu büyük avantajı biridir yukarıda Bows okudum ve dolduran.

OR Tarih:

benim küçük klinikte biz klinikte kararlaştırılan zaman zaman görünür istiyoruz bekleme süresi tutmak. Ameliyat günü için size / çocuguñuna sağlanacak özel giyim, uygun bir gömlek vardır gerekir.

çocuk cerrahisi için: cerrahi eve bir sıcaklık ölçümü yapılmalıdır önce. ateş veya sağlık diğer değişiklik, biz hemen bir telefon briefing için sorarsınız. Lütfen cogiven tartışıldı yamaları gerekli ekleyiniz.

Ameliyattan önce, hastanın, yani açlık olmalı hiçbir şey mide içeriğinin bir geçit için akciğerlere gelemediyor çok koymak zorunda. cerrahi, diş eti veya emme tatlıları çığneme içmek süt daha fazla yemiyorum önce Bu nedenle en az 6 saat olabilir. (Süt çay içmek!) Veya soda üç saat süre öncesine kadar izin verilir.

Ne yazık ki tekrar tekrar çocukların Munch ameliyat tarihinden bir şey bu durumda belirtilen olmak için önce, tarih maalesef olmuyor.

hazırlık odasında / OP

Genç çocuk yatıştırıcı bir suyu alacaksınız. referans varlığında, bir ven içine plastik bir kanül ile çocuk yerleştirin. Bu anestezik yama yardımı ile ağrısız ve aynı zamanda çok küçük çocuklar katıldığı olacaktır.

Yetişkin heyecanlanır yalnızca bir sedatif, bunlar genellikle uzun ömürlü etkisi ve operasyon şey sonra zihinsel zindelik limit.

OR, hasta uyanırken bir infüzyonu ile çok hızlı ve aynı hızla o uyanacak cerrahi sonrası iyi bir gece uykusu kadar sonra tekrar.

küçük çocuklar için genel anestezi genellikle bile hazırlık odasında ebeveyn varlığında başlatılır.

Kurtarma oda:

Ameliyat sonrası uyanma odasında bir süre (yaklaşık 2 saat) için size destek olacaktır. Burada bir caregiver ağırlığında olacak bir alandır. için Bazen çocuklar hakkında $\frac{1}{4}$ - uyanma odasında $\frac{1}{2}$ saat biraz yetişirilir. Sonra, içecek bir film izlemek ya da sadece henüz uyku. Hastaların çoğu yiyebilir ve yoğurt var.

Gün operasyon:

hayır Araç •!

ağır fiziksel yük (ayrıca çılgın) •!

- Ağrı için öngörülen ilaç ver
- sizin şirkette ev ve evde sağlanacaktır yolda olduğundan emin olun.

Ne zaman bizimle gerekli istişare nedir? beni arayın:

- tolere edilebilir değil acı

38,5 ° C'nin üzerinde • ateş yükselir

şişme • beklenmedik olay

- Kanama

- Sürekli bulantı

• ve diğer tüm sorunları

Bize ulaşmak için:

Telefon: 02302 / 57093



Englisch

Dear patients, dear parents

you should be a procedure performed under anesthesia. I would ask you to read the following information carefully and follow them.

You will receive an anesthetic, which is perceived by most patients as very pleasant. This anesthetic is made with the best currently available treatments as well as a monitor, which is well above the statutory guidelines.

With this page, we want to give you some information and explanations for ambulatory surgery. It is of great advantage if you already have a preliminary investigation prior to the above Bows have read and filled out.

OR Date:

To keep the waiting time in my small clinic we ask you in time for the agreed time in the clinic to appear. For the day of the operation you need / your child has no special clothing, an appropriate shirt will be provided.

For children's surgery: Before surgery should be carried home a temperature measurement. If fever or other modification of health, we ask for an immediate telephone briefing. Please attach the necessary patches as discussed at cogiven.

Before surgery, the patient must be fasting, ie have nothing to put in so it can not come to a passage of stomach contents into the lungs. It may therefore be at least 6 hours before surgery do not eat more, drink milk, chewing gum or sucking sweets. Drinking tea (no milk!) Or soda is allowed up to three hours before the deadline.

Unfortunately it happens again and again that children munch before the surgery date something to be laid in this case, the date unfortunately.

In the preparation room / OP

Younger children will receive a soothing juice. In the presence of the reference, we place the child with a plastic cannula into a vein. This is painless with the aid of an anesthetic patch and will be participated also by very young children.

Adults get excited only when a sedative, as these often long-lasting effect and limit the mental fitness after the operation something.

In the OR, the patient is asleep by an infusion very quickly and just as quickly he will wake up after surgery, as after a good night's sleep again.

For younger children general anesthesia is usually started even in the presence of parents in the preparation room.

Recovery room:

After the operation we will support you for a while (about 2 hours) in the recovery room. Here is an area where a caregiver will weigh. Occasionally children for about $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ hours in the recovery room are slightly raised. Then you can drink, watch a movie or simply sleep yet. Most patients can eat and have a yogurt.

Day of the operation:

- no ability to drive!
- no heavy physical load (also raving)!
- Give the prescribed medication for pain
- Make sure that you are on the way home in the company and at home will be provided.

When is a necessary consultation with us? Call me at:

- not tolerable pain
- fever rises above 38.5°C
- unexpected occurrence of swelling
- Bleeding

- continuous nausea
- and also in all other problems

How to reach us:

Phone: 02302 / 57 093



Russisch

Уважаемые пациенты, дорогие родители

Вы должны быть процедура, проводимая под наркозом. Я хотел бы попросить вас, прочтите следующую информацию и следуйте им.

Вы будете получать обезболивающие, которые воспринимаются большинством пациентов как очень приятно. Это обезболивающий производится с лучшими в настоящее время лечения, а также контролировать, что значительно выше уставных принципов.

С этой страницы, мы хотим дать вам некоторые сведения и объяснения по амбулаторной хирургии. Это большое преимущество, если у вас уже есть предварительное расследование до выше Луки прочли и заполнения.

Или дату:

Чтобы сохранить время ожидания в моей маленькой клинике мы просим вас в сроки, согласованные сроки в клинике появится. В день операции необходимо / у вашего ребенка нет специальной одежды, соответствующие рубашка будет оказана.

Для детской хирургии: До операции следует проводить дома измерения температуры. Если температура или другие изменения здоровья, мы требуем немедленного брифинг телефону. Пожалуйста, приложите необходимые исправления, которые обсуждались на cogiven.

До операции пациент должен быть пост, т. е. нечего положить в так что не могут прийти к прохождению содержимого желудка в легкие. Поэтому, возможно, по крайней мере 6 часов до операции не есть больше, пить молоко, жевательную резинку или сосать конфеты. Пить чай (без молока!) Или соду можно установить до 3 часов до истечения крайнего срока.

К сожалению, это происходит снова и снова, что дети до жевать что-то операции сроки, которые будут заложены в этом случае дата, к сожалению.

В ходе подготовки номер / OR

Младшие дети будут получать успокаивающим соком. При наличии ссылки, мы размещаем ребенка с пластиковой канюли в вену. Это безболезненная с помощью анестезии патч и будет участвовали также совсем маленьких детей.

Взрослые волноваться только тогда, когда успокоительное, так как они зачастую длительного действия и ограничение психического здоровья после операции, что-то.

В OR, пациент спит насторой очень быстро и так же быстро он проснется после операции, так как после хорошего ночного сна снова.

Для детей младшего возраста общей анестезии, как правило, начинается еще в присутствии родителей, в подготовке номера.

Восстановление номер:

После операции мы будем поддерживать вас на некоторое время (около 2 часов) в послеоперационной палате. Вот та область, где уход будет весить. Иногда дети около $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ часа в послеоперационной палате немного подняты. Затем вы можете выпить, посмотреть фильм или просто спать. Большинство пациентов могут съесть и йогурт.

День операции:

- не способность к вождению!
- отсутствие тяжелой физической нагрузки (также бред)!
- Дайте предписанные лекарства для боль
- Убедитесь, что вы находитесь на пути домой в компании и на дому будет оказана.

Когда необходимые консультации с нами? Позвоните мне по адресу:

- не более терпимый
- повышение температуры выше 38,5 ° C
- неожиданное появление набухания
- Кровотечение
- постоянная тошнота
- а также во всех других проблем,

Как с нами связаться:

Телефон: 02 302 / 57 093



Albanisch

pacientët nderuar, i dashur prindër

ju duhet të jetë një procedurë të kryhet nën anestezi. Unë do t'ju kërkojë për të lexuar informacionin e mëposhtëm me kujdes dhe të ndjekin ato.

Ju do të pranoni një anestezisë, e cila është perceptuar nga shumica e pacientëve si shumë të këndshme. Kjo është bërë me anestezion trajtimet më të mira aktualisht në dispozicion si edhe një monitor, e cila është shumë më tepër se udhëzimet ligjore.

Me këtë faqe, ne duam të ju japidisë disa këshilla dhe shpjegime për kirurgji ambulator. Ai është i avantazh i madh, nëse ju tashmë keni një hetim paraprak para se të mësipërme Harqet e kam lexuar dhe plotësuan.

OSE Data:

Për të mbajtur koha e pritjes në klinikën time të vogël ne ju kërkojmë në kohë për herë të rënë dakord në klinikë për të dalë. Për ditën e operacionit ju duhet / fëmija juaj nuk ka veshje speciale, një këmishë të përshtatshme do të ofrohen.

Për kirurgji të fëmijëve: Para operacionit duhet të kryhen në shtëpi një për temperaturën. Nëse temperaturë apo modifikimin e tjera të shëndetit, që të kërkojë një konferencë telefonike të menjëhershëm. Ju lutemi të bashkëngjiteti nevojshme patches diskutua si në cogiven.

Para operacionit, pacienti duhet të agjërimi, dmth nuk kanë asgjë për të vënë në kështu që nuk mund të vijnë në një pasazh të përmbajtjes stomak në mushkëri. Ajo mund të jetë i të paktën 6 orë para operacioni nuk ha shumë, pi qumësht, çamçakëz apo embëlsirat gjiri. Pirja e çajit (nuk ka qumësht!) Apo sode lejohet deri në tre orë para afatit.

Për fat të keq kjo ndodh përsëri dhe përsëri që fëmijët përtyp diçka para datës kirurgji për të hedhur në këtë rast, data e për fat të keq.

Në dhomën përgatitjen / OP

Fëmijët më të vegjël do të marrin një lëng qetësues. Në prani të referencës, ne vendin e fëmijës me një pipëz plastike në një mënyrë. Kjo është pa dhimbje, me ndihmën e një copë toke anestezie dhe do të marrë pjesë edhe nga fëmijët shumë të vegjël.

Të rriturit marrin zemërim vetëm në një qetësues, si shpesh këto efekt afatgjatë dhe kufizojnë palestër mendore pas diçka kirurgji.

Në OSE, pacienti është në gjumë nga një infuzion shumë shpejt dhe po aq shpejt ai do të zgjohen pas një operacioni, si pas fjetur një natë të mirë të përsëri.

Për fëmijët më të vegjël anestezi e përgjithshme është filluar zakonisht edhe në prani të prindërve në sallën e përgatitjes, dhomë Rimëkëmbjes:

Pas operacionit, ne do t'ju mbështesë për një kohë (rreth 2 orë) në dhomë shërim. Këtu është një fushë ku një caregiver do të peshojnë. fëmijë Herë pas here për rreth $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ orë në dhomën e shërimit janë ngritur pak. Pastaj ju mund të pirë, të shikojnë një film ose thjesht fle ende. Shumica e pacientëve mund të hajë dhe të ketë një kos.

Dita e operacionit:

- ka aftësi për të përzënë!
- nuk ka peshë të rëndë fizike (edhe jermi!)
- Jepni e medikamenteve për dhimbje
- Sigurohuni se jeni në rrugë në shtëpi në shoqëri dhe në shtëpi do të ofrohen.

Kur është një konsultë e nevojshme me ne? Thirrni në:

• dhimbje nuk lejueshëm

ngrihet • temperaturë mbi $38,5^{\circ}\text{C}$

• dukuri e papritur eënjtje


• Gjakderdhje

përzier • vazhdueshëm

• dhe gjithashtu në të gjitha problemet e tjera

Si deri tek ne:

Telefon: 02302 / 57 093



Französich

Chers patients, chers parents

vous devez être une opération effectuée sous anesthésie. Je vous demande de lire attentivement les informations suivantes et de les suivre.

Vous recevrez un anesthésique, qui est perçu par la plupart des patients que très agréable. Cette anesthésie est faite avec les meilleurs traitements actuellement disponibles ainsi que d'un moniteur, ce qui est bien au-dessus des lignes directrices réglementaires.

Avec cette page, nous voulons vous donner quelques informations et des explications pour la chirurgie ambulatoire. Il est un grand avantage si vous avez déjà une enquête préliminaire avant le plus haut Archets pour avoir lu et remplis.

OU Date:

Pour garder le temps d'attente dans ma petite clinique, nous vous demandons à temps pour le moment convenu dans la clinique de comparaître. Pour le jour de l'opération dont vous avez besoin ou votre enfant n'a pas de vêtements spéciaux ou si une chemise est faite.

Pour la chirurgie des enfants: Avant l'intervention doit être effectuée chez un mesure de la température. Si la fièvre ou autre modification de la santé, nous demandons une réunion téléphonique immédiate. S'il vous plaît joindre les correctifs nécessaires tel que discuté au cogiven.

Avant la chirurgie, le patient doit être à jeun, c'est à dire n'ont rien à mettre en sorte qu'il ne peut pas venir à un passage du contenu gastrique dans les poumons. Il peut donc être d'au moins 6 heures avant l'intervention ne mangent plus, boivent du lait, gomme à mâcher ou des bonbons sucer. Boire du thé (sans lait!) Ou de la soude est autorisé jusqu'à trois heures avant la date limite.

Malheureusement il arrive encore et encore que Munch enfants avant la date de la chirurgie quelque chose qui sera fixée dans ce cas, la date malheureusement.

Dans la salle de préparation / OP

Les jeunes enfants recevront un jus apaisante. En présence de la référence, nous plaçons l'enfant avec une canule en plastique dans une veine. Ce n'est pas douloureux à l'aide d'un patch anesthésiant et sera également participé par de très jeunes enfants.

Adultes s'énerver que si un sédatif, étant donné que ces effets souvent de longue durée et de limiter l'aptitude mentale après l'opération de quelque chose.

Dans les RUP, le patient est endormi par une infusion très rapidement et tout aussi rapidement, il va se réveiller après une intervention chirurgicale, comme après une bonne nuit à nouveau.

Pour les jeunes enfants anesthésie générale est habituellement commencé, même en présence des parents dans la salle de préparation.

Salle de réveil:

Après l'opération, nous vous soutiendrons pendant un certain temps (environ 2 heures) dans la salle de réveil. Voici un domaine où un soignant pèsera. Parfois les enfants pendant environ ¼ - ½ heures dans la salle de réveil sont légèrement surélevés. Ensuite, vous pouvez boire, regarder un film ou tout simplement dormir encore. La plupart des patients peuvent manger et un yaourt.

Journée de l'opération:

- pas de capacité à conduire!
- pas de lourde charge physique (aussi délirant)!
- Donner les médicaments prescrits contre la douleur
- Assurez-vous que vous êtes sur le chemin du retour dans l'entreprise et à la maison seront fournis.

Quand une consultation nécessaires avec nous? Appelez-moi au:

- douleur n'est pas tolérable
- fièvre monte au-dessus de 38,5 ° C
- événement inattendu de gonflement
- Bleeding
- nausées continue
- et dans tous les autres problèmes

Comment nous rejoindre:

Téléphone: 02302 / 57 093



Αγαπητοί ασθενείς, αγαπητοί γονείς

Θα πρέπει να είναι μια διαδικασία που εκτελείται υπό αναισθησία. Θα σας παρακαλούσα να διαβάσετε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες και να τις ακολουθήσετε.

Θα λάβετε ένα αναισθητικό, η οποία γίνεται αντιληπτή από τους περισσότερους ασθενείς ως πολύ ευχάριστη. Αυτή η αναισθησία γίνεται με τις καλύτερες διαθέσιμες θεραπείες, καθώς και μια οθόνη, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ το νόμιμο κατευθυντήριες γραμμές.

Με αυτή τη σελίδα, θέλουμε να σας δώσουμε μερικές πληροφορίες και εξηγήσεις για περιπατητικούς χειρουργική επέμβαση. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα, αν έχετε ήδη μια προκαταρκτική εξέταση, πριν από την ανωτέρω Τα δοξάρια, έχω διαβάσει και να συμπληρωθεί.

Η Ημερομηνία:

Για να διατηρήσετε το χρόνο αναμονής σε μικρή κλινική μου σας ζητάμε εγκαίρως για το συμφωνημένο χρόνο στην κλινική για να εμφανιστούν. Για την ημέρα της επιχείρησης θα πρέπει να έχετε / το παιδί σας δεν έχει καμία ειδική ενδυμασία, ένα κατάλληλο πουκάμισο θα πρέπει να παρέχονται.

Για τη χειρουργική επέμβαση για παιδιά: Πριν από τη χειρουργική επέμβαση πρέπει να γίνεται στο σπίτι μια μέτρηση της θερμοκρασίας. Αν πυρετός ή άλλη τροποποίηση της υγείας, ζητάμε την άμεση ενημέρωση τηλέφωνο. Παρακαλείστε να επισυνάψετε τα απαραίτητα patches, όπως συζητήθηκε στη cogiven.

Πριν την επέμβαση, ο ασθενής πρέπει να είναι η νηστεία, δηλαδή δεν έχουν τίποτα να θέσει σε συνεπώς δεν μπορεί να έρθει σε ένα απόσπασμα από το περιεχόμενο του στομάχου στους πνεύμονες. Επομένως, μπορεί να είναι τουλάχιστον 6 ώρες πριν από τη χειρουργική επέμβαση, δεν τρώνε περισσότερο, πίνουν γάλα, τσίχλες ή τα γλυκά πιπίλισμα. Πίνοντας τσάι (όχι γάλα!) Ή σόδα επιτρέπεται μέχρι και τρεις ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Έχει συμβεί ξανά και ξανά ότι τα παιδιά tunch πριν από την ημερομηνία χειρουργική επέμβαση κάτι που θα σε αυτή την περίπτωση, η ημερομηνία, δυστυχώς.

Στην αίθουσα παρασκευής / ΕΠ

Τα μικρότερα παιδιά θα λάβουν ένα χαλαρωτικό χυμό. Παρουσία της αναφοράς, τοποθετούμε το παιδί με μια πλαστική κάνουλα μέσα σε φλέβα. Αυτό είναι ανώδυνη με τη βοήθεια ενός αναισθητικού patch και θα συμμετάσχει, επίσης, από πολύ μικρά παιδιά.

Ενήλικες ενθουσιάζονται μόνο όταν ένα ηρεμιστικό, καθώς αυτές συχνά μακράς διάρκειας και να περιορίσει τη διανοητική ικανότητα, μετά την πράξη κάτι.

Στο Ή, ο ασθενής κοιμάται από έγχυση πολύ γρήγορα και εξίσου γρήγορα θα ξυπνήσει μετά από χειρουργική επέμβαση, καθώς μετά από ένα καλό βραδινό ύπνο πάλι.

Για τα μικρότερα παιδιά γενική αναισθησία είναι συνήθως ξεκινήσει ακόμα και στην παρουσία των γονέων στην αίθουσα παρασκευής.

Ανάκτηση δωμάτιο:

Μετά την επέμβαση θα σας υποστηρίξουμε για λίγο (περίπου 2 ώρες) στο χώρο ανάνηψης. Εδώ είναι μία περιοχή όπου ο φροντιστής θα σταθμίσει. Περιστασιακά τα παιδιά για περίπου $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ ώρες στο χώρο ανάνηψης είναι ελαφρώς αυξηθεί.

Στη συνέχεια, μπορείτε να πιείτε, να παρακολουθήσετε μια ταινία ή απλώς κοιμούνται ακόμα. Οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να φάνε και να έχουν ένα γιαούρτι.

Ημέρα της δράσης:

- Δεν ικανότητα οδήγησης!
- Δεν βαριά σωματική φορτίο (και έξαλλος)!
- Δώστε την φαρμακευτική αγωγή για τον πόνο
- Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στο δρόμο για το σπίτι στην επιχείρηση και στο σπίτι θα πρέπει να παρέχονται.

Όταν είναι απαραίτητη διαβούλευση με εμάς; Τηλεφώνησέ μου στο:

- Δεν ανεκτό πόνο
- αυξήσεις πυρετός πάνω από 38,5 ° C
- απροσδόκητη εμφάνιση του οιδήματος
- Αιμορραγία
- συνεχής ναυτία
- καθώς επίσης και σε όλα τα άλλα προβλήματα

Πώς θα φτάσετε:

Τηλέφωνο: 02302 / 57 093



Italienisch

Cari pazienti, cari genitori

si dovrebbe essere una procedura eseguita in anestesia. Vi chiedo di leggere attentamente le seguenti informazioni e seguirli.

Riceverai un anestetico, che viene percepito dalla maggior parte dei pazienti come molto piacevole. Questo anestetico è realizzato con i migliori trattamenti attualmente disponibili, nonché un monitor, che è ben al di sopra della disciplina di legge.

In questa pagina, vogliamo darvi alcune informazioni e spiegazioni per la chirurgia ambulatoriale. E' di grande vantaggio se hai già un esame preliminare prima del sopra Archi di aver letto e compilato.

O la data:

Per mantenere i tempi di attesa nella mia piccola clinica vi chiediamo in tempo per il tempo concordato in clinica a comparire. Per il giorno dell'operazione ti serve / il bambino ha nessun abbigliamento particolare, una camicia del caso verranno fornite.

Per la chirurgia dei bambini: Prima dell'intervento dovrebbe essere portato a casa una misura di temperatura. Se la febbre o altra modificazione della salute, chiediamo per un briefing telefonico immediato. Si prega di allegare le necessarie patch di quanto discusso a cogiven.

Prima di un intervento chirurgico, il paziente deve essere a digiuno, vale a dire non hanno nulla da mettere in modo che non possa venire ad un passaggio di contenuto gastrico nei polmoni. Può quindi essere di almeno 6 ore prima dell'intervento chirurgico non mangiano di più, il latte bere, gomma da masticare o succhiare caramelle. Bere tè (senza latte!) O soda è consentito fino a tre ore prima della scadenza.

Purtroppo succede ancora e ancora che Munch figli prima della data di intervento chirurgico per qualcosa di cui essere in questo caso, la data purtroppo.

Nella sala preparazione / OP

I bambini più piccoli riceveranno un succo di calmante. Alla presenza del riferimento, abbiamo posto il bambino con una cannula di plastica in una vena. Questo è indolore, con l'aiuto di un cerotto anestetico e sarà partecipato anche da bambini molto piccoli.

Adulti eccitarsi solo quando un sedativo, in quanto tali effetti spesso di lunga durata e di limitare l'idoneità mentale dopo l'operazione qualcosa.

Nel OR, il paziente è addormentato da una infusione molto velocemente e altrettanto velocemente si sveglierà dopo l'intervento chirurgico, come dopo un sonno della buona notte di nuovo.

Per i bambini più piccoli l'anestesia generale è di solito avviato anche in presenza dei genitori nella sala di preparazione.

Recupero camera:

Dopo l'operazione vi aiutiamo per un po' (circa 2 ore) nella sala di rianimazione. Qui è una zona dove un caregiver peserà. Di tanto in tanto i bambini per circa ¼ - ½ ore nella sala di rianimazione sono leggermente sollevati. Poi si può bere, guardare un film o semplicemente dormire ancora. La maggior parte dei pazienti possono mangiare e uno yogurt.

Giorno della operazione:

- nessuna capacità di guidare!
- non pesante carico fisico (anche delirando)!
- Fornire i farmaci prescritti per il dolore
- Assicurarsi che siete sulla strada di casa in azienda ea casa saranno forniti.

Quando è necessaria una consultazione con noi? Call me a:

- dolore non tollerabile
- febbre sale sopra 38,5 ° C
- imprevisto di gonfiore
- Sanguinamento
- nausea continua
- e anche in tutti gli altri problemi

Come raggiungerci:

Telefono: 02302 / 57 093



بیماران عزیز ، پدر و مادر عزیز
شما باید مراحل زیر انجام بیهوده‌ی. من می خواهم به شما اطلاعات زیر را به دقت مطالعه و پیگیری آنها را بپرسید.
شما بیهوده‌ی ، که توسط بیشتر بیماران را بسیار لذت بخش تصور دریافت خواهد نمود. این بیهوده‌ی با بهترین درمان در حال حاضر در دسترس ساخته شده و همچنین نظرارت ، که به خوبی در بالا رهنمودهای قانونی.
با استفاده از این صفحه ، ما می خواهیم برای شما برخی از اطلاعات و توضیحات برای جراحی سیار به من بدھید. این از مزایای بزرگ این است که اگر شما در حال حاضر تحقیقات مقدماتی قبل از بالا **Bows** خوانده و پر.

با تاریخ :
برای نگه داشتن زمان انتظار در درمانگاه های کوچک من ، ما از شما درخواست در زمان توافق شده در زمان به درمانگاه ظاهر می شود. برای روز از عملیات شما نیاز دارید / فرزند شما ندارد لباس خاص ، پیراهن مناسب ارائه خواهد شد.
عمل جراحی برای کودکان : قبل از عمل جراحی باید در خانه انجام اندازه گیری دما است. اگر تدبیر یا اصلاح سایر سلامت ، ما برای جلسه فوری تنفسی بپرسید. لطفاً خود پیوست لازم به عنوان تکه های در **cogiven** بحث شده است.
قبل از عمل جراحی ، بیمار باید ناشتا باشد ، یعنی که چیزی برای قرار دادن در پس آن نمی توانند به پاساژ محتویات معده به ریه ها. بنابراین ممکن است حداقل 6 ساعت قبل از عمل جراحی را بیشتر خوردن نیست ، شیر بتوشید ، جویدن آدامس یا مکیدن شیرینی. نوشیدن چای (بدون شیر!) و یا سودا است که تا قبل از مهلت 3 ساعت مجاز می باشد.
متاسفانه ان اتفاق می افتد که دوباره و دوباره جویدن کودکان قبل از عمل چیزی تاریخ می شود در این مورد گذاشته ، تاریخ متاسفانه.

در اتفاق آماده سازی / عملیات
کودکان جوانتر خواهد درست کین دهنده دریافت خواهید کرد. در حضور مرجع ، ما کودک را با محل کانول پلاستیکی به ورید. این است که بدون درد با کمک بیهوده و وصله خواهد شد همچنین کودکان بسیار جوان شرکت کرد.
بزرگسالان دریافت هیجان زده تنها زمانی که آرام بخش ، به عنوان این اثر غالباً طولانی مدت و محدود تناسب روانی پس از عمل چیزی.
در یا ، بیمار خواب است توسط انفوژیون خیلی سریع و فقط به سرعت او را از خواب بیدار بعد از عمل ، به عنوان بعد از خواب خوب شب دوباره.
برای کودکان کوچکتر معمولاً از بیهوده عمومی است که حتی در حضور پدر و مادر در اتفاق آماده سازی آغاز شده است.
اتفاق بیهودی :

پس از عملیات ما شما را برای مدتی (در حدود 2 ساعت) در اتفاق بیهودی پشتیبانی می کند. در اینجا که در آن منطقه خواهد شد مرأقب وزن است. گاهی اوقات کودکان در حدود $\frac{1}{4}$ ساعت و نیم در اتفاق بیهودی اندکی برجسته هستند. سپس شما می توانید نوشیدنی ، تماشای فیلم و یا به سادگی خواب نشده است. بیشتر بیماران می توانند غذا خوردن و ماست.

روز عملیات :

- هیچ توانایی رانندگی!
- هیچ بار سنگین فیزیکی (همچنین **raving**)!
- دارو تجویز می شوند درد را
- اطمینان حاصل کنید که شما را در راه خانه در شرکت و در خانه ارائه داده خواهد شد می باشد.
- وقتی که مشاوره لازم را با ما؟ مرا صدا بزن در :
- درد قابل تحمل نیست
- افزایش تتبال 38.5 درجه سانتی گراد
- بروز تورم غیرمنتظره
- خونریزی
- تهوع مداوم
- و نیز در همه مسائل دیگر
- چگونه به ما برسد :

تلفن : 093 57 / 02302

Polnisch

pacjentów Szanowni Państwo, drodzy rodzice powinno być wykonywane w znieczuleniu procedury. Chciałbym prosić, aby przeczytać uważnie następujące informacje i ich przestrzegania.

Otrzymasz środek znieczulający, który jest postrzegany przez większość pacjentów jako bardzo przyjemne. To znieczulenie jest z najlepszych dostępnych obecnie metod leczenia, jak i monitor, który jest znacznie powyżej ustawowego wytycznych.

Z tej strony, chcemy dać Państwu kilka porad i wyjaśnień w chirurgii ambulatoryjnej. Jest to bardzo korzystne, jeśli masz już wstępne dochodzenie przed ponad Łuki przeczytałem i wypełnione.

Lub data:

Aby zachować czas oczekiwania w moim małym klinice prosimy w czasie uzgodnionym czasie w klinice do stawienia się. W dniu operacji musisz / dziecko nie ma specjalnego ubrania, odpowiednie shirt będzie zapewniony.

Chirurgiczny dla dzieci: Przed zabiegem należy wykonać pomiar temperatury domu. Jeśli gorączka lub zdrowia innych modyfikacji, prosimy o natychmiastowe briefing telefon. Proszę załączyć niezbędne poprawki omówione w cogiven.

Przed zabiegem pacjent musi być na czczo, tzn. nie masz nic do wprowadzenia, więc nie może przyjść do przejścia treści żołądka do płuc. Dlatego może być co najmniej 6 godzin przed zabiegem nie jeść więcej, Pij mleko, gumy do żucia lub cukierki do ssania. Picia herbaty (nie mleka!) Lub sody może nawet trzy godziny przed terminem.

Niestety zdarza się raz po raz, że Munch dzieci przed czymś daty operacji, które zostaną określone w niniejszej sprawie, datę niestety.

W pokoju przygotowawczym / OP

Młodsze dzieci otrzymują kojący soku. W obecności odniesienia, miejsce dziecka z plastikową kaniulą do żyły. To jest bezbolesny przy pomocy znieczulenia patch i będzie uczestniczył także bardzo małych dzieci.

Dorosłych denerwować się tylko wtedy, gdy środek uspokajający, ponieważ efekt często długotrwałe i ograniczyć umysłowa coś po operacji.

W OR, pacjent śpi we wlewie bardzo szybko i równie szybko będzie obudzić się po zabiegu, jak po dobrze przespanej nocy ponownie.

Dla młodszych dzieci znieczulenie ogólne rozpoczyna się zwykle nawet w obecności rodziców w pokoju przygotowawczym.

pokój Recovery:

Po operacji będąśmy wspierać się na chwilę (ok. 2 godziny) w sali pooperacyjnej. O to obszar, w którym opiekun będzie ważyć. Od czasu do czasu dla dzieci o ¼ - ½ godziny w sali pooperacyjnej są lekko uniesione. Następnie można pić, obejrzeć film lub po prostu spać jeszcze. Większość pacjentów może jeść i jogurt.

Dnia pracy:

- brak możliwości prowadzenia pojazdów mechanicznych!
- nie ciężkie obciążenie fizyczne (także brednie!)
- Daj przepisany lek na ból
- Upewnij się, że jesteś w drodze do domu w firmie i w domu będzie zapewniony.

Gdy jest to konieczne po konsultacji z nami? Zadzwoń do mnie na:

- Nie dopuszczalne bóle
- gorączka wzrasta powyżej 38,5 ° C
- nieoczekiwane wystąpienie obrzęku
- Krwawienie
- ciągłe nudności
- a także we wszystkich innych problemów

Jak do nas dojechać:

Telefon: 02302 / 57 093



Portugisisch

Caros pacientes, queridos pais
você deve ser um procedimento realizado sob anestesia. Peço que você leia atentamente a informação seguinte e segui-los.

Você receberá um anestésico, que é percebida pela maioria dos pacientes, muito agradável. Esta anestesia é feita com os melhores tratamentos disponíveis atualmente, bem como um monitor, que está bem acima das orientações legais. Com esta página, queremos dar-lhe algumas informações e explicações para a cirurgia de ambulatório. É uma grande vantagem se você já tiver uma investigação preliminar antes do referido Arcos de ter lido e preenchido.

OR Data:

Para manter o tempo de espera na minha pequena clínica pedimos a tempo para o prazo estabelecido na clínica para aparecer. Para o dia da operação que você precisa ou o seu filho não tem roupas especiais, uma camisa passará a dispor.

Para a cirurgia da criança: Antes da cirurgia deve ser realizada em casa a medição da temperatura. Se a febre ou outra modificação de saúde, pedimos uma entrevista por telefone imediato. Anexar os patches necessários como discutido na cogiven.

Antes da cirurgia, o paciente deve estar em jejum, ou seja, não tenho nada para colocar na forma que ele não pode chegar a uma passagem do conteúdo gástrico para os pulmões. Por conseguinte, pode ser pelo menos 6 horas antes da cirurgia não comer mais, beber leite, gomas de mascar ou doces de sucção. Beber chá (sem leite!) Ou refrigerante é permitido até três horas antes do prazo.

Infelizmente isso acontece repetidas vezes que mastiga as crianças antes da data da cirurgia algo a ser estabelecidas no presente caso, a data infelizmente.

Na sala de preparação / OP

As crianças mais jovens receberão um suco calmante. Na presença da referência, colocamos a criança com uma cânula de plástico em uma veia. Esta é indolor, com o auxílio de um remendo anestésico e será participaram também por crianças muito pequenas.

Adultos ficar animado somente quando um sedativo, uma vez que estes efeitos muitas vezes de longa duração e limite a aptidão mental após a operação de alguma coisa.

No RUP, o paciente está dormindo por uma infusão muito rápida e tão rapidamente que ele vai acordar após a cirurgia, como depois de um sono de boa noite outra vez.

Para crianças com anestesia geral é geralmente iniciada ainda na presença dos pais na sala de preparação.
sala de recuperação:

Após a operação que irá apoiá-lo durante algum tempo (cerca de duas horas) na sala de recuperação. Aqui é uma área onde um cuidador vai pesar. Ocionalmente as crianças para cerca de $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ horas na sala de recuperação são ligeiramente levantada. Depois, você pode beber, assistir a um filme ou simplesmente dormir ainda. A maioria dos pacientes podem comer e ter um iogurte.

Dia da operação:

- sem capacidade de conduzir!
- sem carga pesada física (também delirante)!
- Dar a medicação prescrita para a dor
- Certifique-se que você está no caminho de casa na empresa e em casa vai ser prestado.

Quando é necessário uma consulta com a gente? Chame-me em:

- dor não tolerável
- aumenta febre acima de 38,5 ° C
- ocorrência inesperada de inchaço
- sangramento
- náusea contínua
- e também em todos os outros problemas

Como chegar até nós:

Telefone: 02302 / 57 093



Rumänisch

Dragi pacienți, dragi părinți
ar trebui să fie o procedură efectuată sub anestezie. Aș ruga să citiți cu atenție următoarele informații și să le urmați.
Veți primi un anestezic, care este percepția majoritatea pacienților ca fiind foarte placuta. Acest lucru se face cu
anestezie cele mai bune tratamente disponibile în prezent, precum și un monitor, care este mult peste liniile directoare
statutar.

Cu aceasta pagina, vrem să vă dău câteva informații și explicații pentru chirurgia ambulatorie. Este un mare avantaj
dacă aveți deja o investigație preliminară înainte de cele de mai sus Arcuri au citit și completat.

Sau data:

Pentru a păstra timpul de așteptare în clinica mica mea va cerem în timp util pentru termenul convenit, în clinica să
apără. Pentru ziua operatiei care aveți nevoie / copilul dumneavoastră nu are nici îmbrăcăminte specială, un tricou
corespunzătoare vor fi asigurate.

Pentru chirurgie pentru copii: Înainte de operatie ar trebui să fie efectuate acasă o măsurare a temperaturii. În cazul în
care febră sau alte modificări ale sănătății, vom cere o informare telefon imediat. Vă rugăm să anexați necesare patch-
uri după cum se discută la cogiven.

Înainte de operatie, pacientul trebuie să fie condiții de repaus alimentar, și anume nu au nimic de a pune în astfel că nu
poate veni la un pasaj de stomac conținutul în plămâni. Aceasta poate fi, prin urmare, cel puțin 6 ore înainte de
intervenția chirurgicală nu mananca mai mult, bea lapte, guma de mestecat sau bomboane suge. Consumul de ceai
(fara lapte) Sau! Sodă este permis până la trei ore înainte de termenul limită.

Din păcate, se întâmplă din nou și din nou că copiii Munch înainte de operatie ceva data urmează să fie stabilite în acest
caz, data din păcate.

În camera de pregătire / PO

Copiii mai mici vor primi un suc linișitor. În prezența de referință, vă loc copil cu o canulă de plastic într-o venă. Aceasta
este nedureros, cu ajutorul unui plasture anestezic și va fi participat, de asemenea, de copii foarte mici.

Adulții te excită doar atunci când un sedativ, deoarece aceste efecte deseori de lungă durată și limită de fitness mentale
după ceva operație.

În SAU, pacientul este adormit de o perfuzie foarte repede și la fel de repede se va trezi după operație, ca după un
somn bun din nou.

Pentru copiii mai mici anestezie generală este, de obicei a început chiar și în prezența părinților în sala de pregătire.

Recuperarea cameră:

Dupa operație va vom sprijini pentru o perioadă de timp (aproximativ 2 ore) în sala de recuperare. Aici este o zonă unde
un îngrijitor va cărora. Ocazional, copiii de aproximativ $\frac{1}{4}$ - ore și jumătate în sala de recuperare sunt ușor ridicate. Apoi,
puteți bea, a viziona un film sau pur și simplu de somn încă. Cei mai mulți pacienți pot mâncă și să aibă un iaurt.

Ziua de operare:

- nici capacitatea de a conduce!
- fără încărcătură fizică grea (de asemenea aiureală)!

Dă • medicamente prescrise pentru durere

- Asigurați-vă că sunteți pe drum spre casă în cadrul companiei și la domiciliu vor fi furnizate.

Atunci când este necesară o consultare cu noi? Suna-mă la:

- Nu tolerabil durere
- febră mai sus se ridică 38.5°C
- apariția neașteptată a umflarea
- Sângerări
- greață continuă
- și, de asemenea, în toate alte probleme

Cum ajungeți la noi:

Telefon: 02302 / 57 093



Russisch

Уважаемые пациенты, дорогие родители

Вы должны быть процедура, проводимая под наркозом. Я хотел бы попросить вас, прочтите следующую информацию и следуйте им.

Вы будете получать обезболивающие, которые воспринимаются большинством пациентов как очень приятно. Это обезболивающий производится с лучшими в настоящее время лекария, а также контролировать, что значительно выше уставных принципов.

С этой страницы, мы хотим дать вам некоторые сведения и объяснения по амбулаторной хирургии. Это большое преимущество, если у вас уже есть предварительное расследование до выше Луки прочли и заполнения.

Или дату:

Чтобы сохранить время ожидания в моей маленькой клинике мы просим вас в сроки, согласованные сроки в клинике появится. В день операции необходимо / у вашего ребенка нет специальной одежды, соответствующие рубашка будет оказана.

Для детской хирургии: До операции следует проводить дома измерения температуры. Если температура или другие изменения здоровья, мы требуем немедленного брифинг телефону. Пожалуйста, приложите необходимые исправления, которые обсуждались на согiven.

До операции пациент должен быть пост, т. е. нечего положить в так что не могут прийти к прохождению содержимого желудка в легкие. Поэтому, возможно, по крайней мере 6 часов до операции не есть больше, пить молоко, жевательную резинку или сосать конфеты. Пить чай (без молока!) Или соду можно установить до 3 часов до истечения крайнего срока.

К сожалению, это происходит снова и снова, что дети до жевать что-то операции сроки, которые будут заложены в этом случае дата, к сожалению.

В ходе подготовки номер / OR

Младшие дети будут получать успокаивающим соком. При наличии ссылки, мы размещаем ребенка с пластиковой канюли в вену. Это безболезненная с помощью анестезии патч и будет участвовали также совсем маленьких детей.

Взрослые волноваться только тогда, когда успокоительное, так как они зачастую длительного действия и ограничение психического здоровья после операции, что-то.

В OR, пациент спит настой очень быстро и так же быстро он проснется после операции, так как после хорошего ночного сна снова.

Для детей младшего возраста общей анестезии, как правило, начинается еще в присутствии родителей, в подготовке номера.

Восстановление номер:

После операции мы будем поддерживать вас на некоторое время (около 2 часов) в послеоперационной палате. Вот та область, где уход будет весить. Иногда дети около $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ часа в послеоперационной палате немного подняты. Затем вы можете выпить, посмотреть фильм или просто спать. Большинство пациентов могут съесть и йогурт.

День операции:

- не способность к движению!
- отсутствие тяжелой физической нагрузки (также бред)!
- Дайте предписанные лекарства для боль
- Убедитесь, что вы находитесь на пути домой в компании и на дому будет оказана.

Когда необходимые консультации с нами? Позвоните мне по адресу:

- не более терпимый
- повышение температуры выше 38,5 ° C
- неожиданное появление набухания
- Кровотечение
- постоянная тошнота
- а также во всех других проблем,

Как с нами связаться:

Телефон: 02 302 / 57 093



Serbian

Поштовани пациенти, драги родитељи

требало би да се поступак изводи под анестезијом. Ја бих вас да прочитате следеће информације пажљиво и пратите их.

Добићете анестезије, која се сматра већина пацијената веома пријатно. Ово анестезија је направљен са најбољом тренутно доступна лечења, као и монитора, што је знатно изнад законских смерница.

Са ове странице, желимо вам дати неке информације и објашњења за амбулантне операције. То је велика предност ако сте већ прелиминарну истрагу пре горе Лукове Прочитао сам и попунити.

Или датум:

Да би време чекања у мој мали клиници молимо вас у време договорено време на клиници да се појави. За дан рада морате / да ваше дете нема посебне одеће, одговарајуће кошуље ће бити обезбеђен.

За дечју хирургију: Пре операције треба да се носи кућни мерење температуре. Ако грозница или друге модификације здравља, тражимо одмах телефоном брифинг. Молимо вас да приложите потребне закрпе као што је објашњено у цогивен.

Пре операције, пациент мора да се пост, односно немају шта да ставите у тако да не може доћи до усвајања садржаја желуца у плућа. Зато може да буде најмање 6 сати пре операције не једе више, пију млеко, жваке или сиса слаткише. Пије чај (без млека) или соде бикарбоне је дозвољено и до три сата пре рока.

Нажалост, то се дешава изнова и изнова да деца жвакати пре нешто операције датум да се положи у овом случају, нажалост датум.

У припреми соба / ОП

Млађа деца ће добити умирујуће сок. У присуству референце, ми пласирамо дете са пластичним канила у вену. Ово је безболан, уз помоћ анестезије патцх и биће, такође, учествовали мале деце.

Одрасли узбудити само онда када седатив, јер су често дуготрајне ефекат и ограничење менталне способности после операције нешто.

У ИЛИ, пациент спава од инфузије веома брзо и исто тако брзо да ће пробудити после операције, као и после добро прославане ноћи опет.

За млађу децу опште анестезије обично започиње још у присуству родитеља у припреми соби.

Опоравка соба:

Након операције ми ћемо Вам подршку за време (око 2 сата) у опоравак соби. Овде је област у којој ће се вагати старатељ. Повремено децу за око $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ сата у соби за опоравак су благо подигнуте. Онда можете да пијете, гледати филм или једноставно још увек спавају. Већина пацијената може да једе и има јогурта.

Дан рада:

- нема способност да возим!
- нема тешких физичких оптерећења (и бунцање)!
- Дајте преписаних лекова против болова
- Проверите да ли сте на путу кући у предузећу и код куће ће бити обезбеђен.

Када је неопходна консултација са нама? Цалл ме на:

- Не подношљив бол
- грозница уздизе изнад 38.5°C
- неочекиване појаве отеклина
- Крварење
- континуирано мучнина
- као и у свим другим проблемима

Како доћи до нас:

Телефон: 02302 / 57 093