



## Wichtiger Hinweis zur Vorbereitung

bitte beachten Sie, dass folgende Medikamente vor dem geplanten Allergietest **nicht** eingenommen werden dürfen, da sie das Ergebnis beeinflussen könnten. Nach dem Test können Sie die Medikamente wieder wie gewohnt einnehmen. Vielen Dank.

Medikament	Pause vor Allergietest
<b>Antihistaminika</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• H1-Blocker: z.B. Lisino, Telfast, Zyrtec, Teldane, Terfenadin, Vividrin, Mizollen, Allerodil, Tavergil, Fenestil, Zaditen, Avil, Omeril</li> <li>• H2-Blocker</li> </ul>	<p>3 – 5 Tage</p> <p>0</p>
<b>Mastzellstabilisatoren</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketotifen</li> <li>• Cromoglicinsäure, Nedocromil</li> </ul>	<p>&gt; 5 Tage</p> <p>0</p>
<b>Glukokortikoide</b>	
z.B. Volon A, Urbason, Ultralan, Celestan, Decortin, Delphicort	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Topisch &gt; 4 Wochen [im Testareal]</li> <li>• Inhalativ</li> <li>• Systemisch/Kurzzeit &lt; 50mg/d Prednisonäquivalent &gt; 50 mg/d Prednisonäquivalent</li> <li>• Systemisch/Langzeit &lt; 10mg/d Prednisonäquivalent &gt; 10 mg/dPrednisonäquivalent</li> </ul>	<p>&gt; 1 Woche</p> <p>0</p> <p>3 Tage</p> <p>1 Woche</p> <p>0</p> <p>3 Wochen</p>
<b>Antiasthmatika:</b>	
z.B. Terbutalin, Bambuterol, Salmeterol, Salbutamol, Theophyllin 0	
<b>Psychopharmaka</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trizyklische Antidepressiva: z.B. Imipramin, Amitriptylin, Desipramin</li> <li>• Neuroleptikum: z.B. Promethazin</li> <li>• Selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer [z.B. Flouxetin, Sertralin]</li> <li>• B- adrenerge Agonisten</li> </ul>	<p>2 Wochen</p> <p>5 Tage</p> <p>0</p> <p>0</p>
<b>Andere</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leukotrienen-Rezeptorantagonisten, Ciclosporin A, Immunglobuline</li> </ul>	<p>0</p>